

Liquid Nitrogen Therapy Post Treatment Care

- In a few hours or days, an ulcer, a crust, or a blister will develop at the treated site. If the blister has a bloody content, do not panic. This is normal.
- If there is a blister, release the contents with a sterile needle. After opening the blister, clean the area with normal saline solution and apply Polysporin, Bacitracin or Bactroban on the area. **Do not apply Neosporin or Triple Antibiotic.** Apply a band-aid and change it daily.
- If there is a crust, cleanse the area with soap and water or normal saline solution and apply Polysporin, Bacitracin or Bactroban on the area. **Do not apply Neosporin.** Apply a band-aid.
- Do not remove the crust. It will increase the risk of scarring.
- In there was an infection or you have any doubts, call the office for instructions or an appointment.

Instrucciones Para la Terapia con Nitrógeno Líquido

- En unas pocas horas o días una úlcera, postilla o ampolla se va a formar. No se asuste, es normal.
- Si se forma una ampolla libere el contenido con una aguja estéril. Luego limpie el área con Solución salina y aplique Polysporin, Bacitracin o Bactroban. **No aplique Neosporin o Triple Antibiotico.**
- Si se forma una postilla, limpie el área con jabón y agua o Solución salina y aplique Polysporin, Bacitracin Bactroban. **No aplique Neosporin o Triple Antibiotico.**
- No remueva la postilla. Esto aumentaría el riesgo de formar cicatrices.
- Evite el sol, el área tratada puede oscurecerse.
- Si se le infectara el área tratada o tiene alguna duda, llame a su doctor para instrucciones o para una cita.